

# CALENDÁRIO DE VACINAS - CRIANÇAS

Vacinas	Do nascimento aos 2 anos de idade													Dos 2 aos 10 anos					Tem na Previnna?				
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	2 anos/ 24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos		10 anos			
<b>BCG ID</b>	Dose única																						
<b>Hepatite B</b>	1ª dose		2ª dose				3ª dose																SIM, TANTO A VACINA HEPATITE B QUANTO A VACINA HEXAVALENTE (DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE, POLIOMIELITE, HAEMOPHILUS INFLUENZAE E HEPATITE B)
<b>Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche)</b>			1ª dose		2ª dose		3ª dose						Reforço		Reforço				Reforço				SIM
<b>Haemophilus influenzae b</b>			1ª dose		2ª dose		3ª dose						Reforço										SIM, TANTO A VACINA PENTAVALENTE (DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE, POLIOMIELITE E HAEMOPHILUS INFLUENZAE) QUANTO A HEXAVALENTE (DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE, POLIOMIELITE, HAEMOPHILUS INFLUENZAE E HEPATITE B)
<b>Poliomielite inativada (VIP)</b>			1ª dose		2ª dose		3ª dose						Reforço		Reforço								SIM, TANTO A VACINA DTPA + POLIOMIELITE QUANTO AS VACINAS PENTAVALENTE (DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE, POLIOMIELITE E HAEMOPHILUS INFLUENZAE) E HEXAVALENTE (DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE, POLIOMIELITE, HAEMOPHILUS INFLUENZAE E HEPATITE B)
<b>Rotavírus</b>			Duas doses																				SIM

# CALENDÁRIO DE VACINAS - CRIANÇAS

Vacinas	Do nascimento aos 2 anos de idade													Dos 2 aos 10 anos					Tem na Previnna?							
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	2 anos/ 24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos		10 anos						
<b>Pneumocócica conjugada</b>			1ª dose		2ª dose		3ª dose						Reforço										SIM, A VACINA PREVENAR (PNEUMOCÓCICA 13/VPC13)			
<b>Meningocócica C</b>				1ª dose		2ª dose							Reforço			Reforço							SIM			
<b>Meningocócica ACWY</b>				1ª dose	2ª e 3ª doses							Reforço			Reforço								SIM			
<b>Meningocócica B</b>				1ª dose		2ª dose		3ª dose					Reforço										SIM			
<b>Influenza (gripe)</b>							Na primeira vacinação, crianças de 6 meses a 9 anos recebem duas doses. Acima dos 9 anos, dose anual.																			SIM
<b>Poliomielite oral</b>													Dias nacionais de vacinação													

# CALENDÁRIO DE VACINAS - CRIANÇAS

Vacinas	Do nascimento aos 2 anos de idade													Dos 2 aos 10 anos					Tem na Previnna?		
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	2 anos/ 24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos		10 anos	
Febre amarela										1ª dose					2ª dose						SIM
Hepatite A											1ª dose		2ª dose								SIM, A VACINA PREVENAR (PNEUMOCÓCICA 13/VPC13)
Tríplice Viral (Sarambo, Caxumba e Rubéola)											1ª dose		2ª dose								SIM
Varicela (Catapora)											1ª dose		2ª dose								SIM
HPV																			Três doses		SIM
Dengue																			Três doses		SIM

# CALENDÁRIO DE VACINAS - CRIANÇAS

Vacinas	Comentários (devem ser consultados)	Vacinas	Comentários (devem ser consultados)
<b>BCG ID</b>	-	<b>Pneumocócica conjugada</b>	Iniciar o mais precocemente possível, no segundo mês de vida. As vacinas conjugadas são recomendadas para menores de 6 anos de idade. Crianças com esquema completo de VPC10, podem se beneficiar com uma dose adicional de VPC13 com o objetivo de ampliar a proteção, respeitando o intervalo mínimo de dois meses da última dose.
<b>Hepatite B</b>	Aplicar a primeira dose nas primeiras 12 horas de vida.	<b>Meningocócica C</b>	No Brasil, a vacina Meningocócica C está licenciada para crianças a partir dos 2 meses de idade. São recomendadas duas doses, aos 3 e 5 meses de idade e reforço entre 12-15 meses. Em virtude da rápida redução dos títulos de anticorpos protetores, reforços são necessários a cada cinco anos, abrangendo toda infância e adolescência.
<b>Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche)</b>	-	<b>Meningocócica ACWY</b>	São recomendadas três doses, aos 3, 5 e 7 meses de idade, e reforço entre 12-15 meses. Em virtude da rápida redução dos títulos de anticorpos protetores, reforços são necessários a cada cinco anos, abrangendo toda infância e adolescência. Crianças com vacinação completa com vacina Meningocócica C podem se beneficiar com uma ou mais doses adicionais (dependendo do produto e da idade) da vacina Meningocócica ACWY, com o objetivo de ampliar a proteção. Respeitar o intervalo mínimo de dois meses da última dose de Meningocócica C.
<b>Haemophilus influenzae b</b>	Recomenda-se o reforço aos 15-18 meses, principalmente quando forem utilizadas, na série básica, vacinas Haemophilus influenzae b nas combinações com a Tríplice Bacteriana (DTPa).	<b>Meningocócica B</b>	São recomendadas três doses, aos 3, 5 e 7 meses de idade, e reforço entre 12-15 meses.
<b>Poliomielite inativada (VIP)</b>	Recomenda-se que, idealmente, todas as doses sejam com a vacina inativada injetável. Não utilizar a vacina oral em crianças hospitalizadas e imunodeficientes.	<b>Influenza (gripe)</b>	É recomendada para todas as crianças a partir dos 6 meses de idade. Crianças menores de 3 anos de idade recebem 0,25 mL por dose e as maiores de 3 anos recebem 0,5 mL por dose. Desde que disponível, a vacina influenza tetravalente é preferível à vacina influenza trivalente, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina tetravalente, utilizar a vacina trivalente.
<b>Rotavírus</b>	A primeira dose pode ser feita a partir de 6 semanas de vida e no máximo até 3 meses e 15 dias, e a última dose até 7 meses e 29 dias. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. Se a criança cuspir, regurgitar ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose. Não utilizar em crianças hospitalizadas. Em caso de suspeita de imunodeficiência ou recém-nascidos cujas mães fizeram uso de biológicos durante a gestação, a vacina pode estar contraindicada e o uso deve ser avaliado pelo médico.	<b>Febre amarela</b>	Recomendada para residentes ou viajantes para áreas de vacinação (principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia). Pode ser recomendada também para atender a exigências sanitárias de determinadas viagens internacionais. Vacinar pelo menos dez dias antes da viagem. O Programa Nacional de Imunização (PNI) recomenda que crianças menores de 2 anos de idade não recebam as vacinas febre amarela e tríplice viral no mesmo dia. Nesses casos, e sempre que possível, respeitar intervalo de 30 dias entre as doses. Contraindicada para imunodeprimidos; mas se os riscos de adquirir a doença superarem os riscos potenciais da vacinação, o médico deverá avaliar a utilização.

# CALENDÁRIO DE VACINAS - CRIANÇAS

Vacinas	Comentários (devem ser consultados)	Vacinas	Comentários (devem ser consultados)
<b>Hepatite A</b>	Para crianças a partir de 12 meses de idade não vacinadas para hepatite B no primeiro ano de vida, a vacina combinada hepatites A + B pode ser considerada para substituir a vacinação isolada (A ou B) com esquema de duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas.	<b>HPV</b>	Duas vacinas estão disponíveis: a HPV Bivalente (contendo os tipos 16 e 18) e a HPV Tetravalente (contendo os tipos 6, 11, 16 e 18). O esquema de doses é a seguinte: a segunda dose entre 1 e 2 meses após a primeira e a terceira dose 6 meses após a primeira. O Programa Nacional de Imunização (PNI) adotou esquema de vacinação com duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas, exclusivamente para meninas de 9 a 13 anos com a vacina HPV Tetravalente.
<b>Tríplice Viral (Sarambo, Caxumba e Rubéola)</b>	É considerada protegida a criança que tenha recebido duas doses da vacina após 1 ano de idade. Em situação de risco para o sarampo – por exemplo, surto ou exposição domiciliar – a primeira dose pode ser aplicada a partir de 6 meses de idade. Nesses casos, a aplicação de mais duas doses após a idade de 1 ano ainda será necessária. O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico.	<b>Dengue</b>	Esquema de três doses com intervalo de 6 meses entre elas. Contraindicada em crianças menores de 9 anos de idade. Contraindicada em imunodeprimidos.
<b>Varicela (Catapora)</b>	É considerada protegida a criança que tenha recebido duas doses da vacina após 1 ano de idade. Em situação de risco – por exemplo, surto de varicela ou exposição domiciliar – a primeira dose pode ser aplicada a partir de 9 meses de idade. Nesses casos, a aplicação de mais duas doses após a idade de 1 ano ainda será necessária. O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico. Aos 12 meses, na mesma visita, aplicar a primeira dose da tríplice viral e varicela em administrações separadas ou com a vacina Tetravalente Viral. A segunda dose de tríplice viral e varicela, preferencialmente com a vacina Tetravalente Viral, pode ser administrada a partir dos 15 meses de idade, mantendo intervalo de três meses da dose anterior.		