

# CALENDÁRIO DE VACINAS – HOMENS (20 a 59 anos)

Vacinas recomendadas	Esquemas e recomendações	Comentários (devem ser consultados)	Tem na Previnna?
<b>Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola)</b>	É considerado protegido o indivíduo que tenha recebido duas doses acima de 1 ano de idade. Caso ainda não tenha recebido, tomar duas doses da vacina, com intervalo de 1 mês entre elas.	-	SIM
<b>Hepatites A, B ou A e B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hepatite A: duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas.</li> <li>&gt; Hepatite B: três doses, sendo a segunda 1 mês após a primeira e a terceira 5 meses após a segunda.</li> <li>&gt; Hepatite A e B: três doses, sendo a segunda 1 mês após a primeira e a terceira 5 meses após a segunda.</li> </ul>	Homens não vacinados na infância para as hepatites A e B devem ser vacinados. A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B.	SIM, TANTO A VACINA HEPATITE A E A VACINA HEPATITE B QUANTO A VACINA HEPATITE A+B.
<b>HPV (Bivalente ou Tetravalente)</b>	O esquema de vacinação é de três doses, sendo a segunda dose 1 a 2 meses depois da primeira e a terceira 6 meses depois da primeira.	A vacina HPV Bivalente é indicada para meninos a partir de 9 anos e a vacina HPV Tetravalente é indicada para meninos e homens de 9 a 26 anos. Pessoas previamente infectadas podem se beneficiar com a vacinação.	SIM, TANTO A BIVALENTE QUANTO A TETRAVALENTE
<b>Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Com esquema de vacinação básico completo: dose de reforço 10 anos após a última dose.</li> <li>&gt; Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose a qualquer momento.</li> </ul>	Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica, recomenda-se a vacina DTPa combinada à Poliomielite inativada. A vacina DTPa + Poliomielite pode substituir a vacina Tríplice Bacteriana (DTPa). A DTPa está recomendada mesmo para aqueles que tiveram a coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente.	SIM, TANTO A VACINA DTPA QUANTO A VACINA DTPA + POLIOMIELITE.
<b>Varicela (Catapora)</b>	Para suscetíveis: duas doses, com intervalo de um a dois meses entre elas.	-	SIM

# CALENDÁRIO DE VACINAS – HOMENS (20 a 59 anos)

Vacinas recomendadas	Esquemas e recomendações	Comentários (devem ser consultados)	Tem na Previnna?
<b>Influenza (Gripe)</b>	Dose única anual.	Desde que disponível, a vacina influenza tetravalente é preferível à vacina influenza trivalente, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina tetravalente, utilizar a vacina trivalente.	SIM
<b>Meningocócica ACWY</b>	Uma dose.	A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerá da situação epidemiológica.	SIM
<b>Meningocócica B</b>	Dois doses com intervalo de um a dois meses.	A indicação da vacina dependerá da situação epidemiológica.	SIM
<b>Febre Amarela</b>	Uma dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação de vacinação (principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia). Se persistir o risco, fazer uma segunda dose dez anos após a primeira. Pode ser recomendada também para atender a exigências sanitárias de determinadas viagens internacionais. Em ambos os casos, vacinar pelo menos dez dias antes da viagem.	-	SIM
<b>Dengue</b>	Três doses com intervalo de seis meses entre elas.	Contraindicada para imunodeprimidos. Licenciada para pessoas entre 9 e 45 anos.	SIM