

Vacinas recomendadas	Esquemas e recomendações	Comentários (devem ser consultados)	Tem na Previnna?
HPV	O esquema de vacinação é de três doses, sendo a segunda dose 1 a 2 meses depois da primeira e a terceira 6 meses depois da primeira.	A vacina HPV Bivalente é indicada a partir dos 9 anos de idade e a vacina HPV Tetravalente é indicada para meninas e mulheres de 9 a 45 anos. Pessoas previamente infectadas podem se beneficiar com a vacinação. Contraindicada para gestantes.	SIM, TANTO A BIVALENTE QUANTO A TETRAVALENTE
Influenza (Gripe)	Dose única anual.	Desde que disponível, a vacina influenza tetravalente é preferível à vacina influenza trivalente, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina tetravalente, utilizar a vacina trivalente.	SIM
Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche)	<ul style="list-style-type: none"> > Com esquema de vacinação básico completo: dose de reforço 10 anos após a última dose. > Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose a qualquer momento. 	Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica, recomenda-se a vacina DTPa combinada à Poliomielite inativada. A vacina DTPa + Poliomielite pode substituir a vacina Tríplice Bacteriana (DTPa). A DTPa está recomendada mesmo para aqueles que tiveram a coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente.	SIM, TANTO A VACINA DTPa QUANTO A VACINA DTPa + POLIOMIELITE.
Hepatites A, B ou A e B	<ul style="list-style-type: none"> > Hepatite A: duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas. > Hepatite B: três doses, sendo a segunda 1 mês após a primeira e a terceira 5 meses após a segunda. > Hepatite A e B: três doses, sendo a segunda 1 mês após a primeira e a terceira 5 meses após a segunda. 	Mulheres não vacinadas na infância para as hepatites A e B devem ser vacinadas. A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B. Hepatite B: recomendada para gestantes.	SIM, TANTO A VACINA HEPATITE A E A VACINA HEPATITE B QUANTO A VACINA HEPATITE A+B.
Meningocócica ACWY	Uma dose.	A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica.	SIM

CALENDÁRIO DE VACINAS – MULHERES (20 a 59 anos)

Vacinas recomendadas	Esquemas e recomendações	Comentários (devem ser consultados)	Tem na Previnna?
Meningocócica B	Duas doses com intervalo de um a dois meses.	A indicação da vacina dependerá da situação epidemiológica.	SIM
Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola)	É considerado protegido o indivíduo que tenha recebido duas doses acima de 1 ano de idade. Caso ainda não tenha recebido, tomar duas doses da vacina, com intervalo de 1 mês entre elas.	Contraindicada para gestantes.	SIM
Varicela (Catapora)	Para suscetíveis: duas doses, com intervalo de um a dois meses entre elas.	Contraindicada para gestantes.	SIM
Febre Amarela	Uma dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação de vacinação (principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia). Se persistir o risco, fazer uma segunda dose dez anos após a primeira. Pode ser recomendada também para atender a exigências sanitárias de determinadas viagens internacionais. Em ambos os casos, vacinar pelo menos dez dias antes da viagem.	Contraindicada para amamentando bebês menores de 6 meses de idade.	SIM
Dengue	Três doses com intervalo de seis meses entre elas.	Contraindicada para imunodeprimidos, gestantes e mulheres amamentando. Licenciada para pessoas entre 9 e 45 anos.	SIM