

| Vacinas recomendadas   | Esquemas e recomendações   | Comentários<br>(devem ser consultados)  | Tem na Previnna?   |
|--|--|---|--|
| <b>PARA DEFINIR VACINAS E ESQUEMAS DE DOSES NA ADOLESCÊNCIA, CONSIDERAR AS VACINAS TOMADAS NA FASE ANTERIOR (CRIANÇA).</b> |  |   |  |
| <b>Tríplice Viral<br/>(Sarampo, Caxumba e Rubéola)</b>   | É considerado protegido o adolescente que tenha recebido duas doses acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de um mês entre elas.  | Contraindicada para gestantes.  | SIM  |
| <b>Hepatites A, B ou A e B</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hepatite A: duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas.</li> <li>&gt; Hepatite B: três doses, sendo a segunda 1 mês após a primeira e a terceira 5 meses após a segunda.</li> <li>&gt; Hepatite A e B: para menores de 16 anos, duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Para maiores de 16 anos, três doses, sendo a segunda 1 mês após a primeira e a terceira 5 meses após a segunda.</li> </ul> | Adolescentes não vacinados na infância para as hepatites A e B devem ser vacinados o mais precocemente possível para essas infecções. A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B. Hepatite B: recomendada para gestantes. | SIM, TANTO A VACINA HEPATITE A E A VACINA HEPATITE B QUANTO A VACINA HEPATITE A+B. |
| <b>HPV (Bivalente ou Tetravalente)</b>   | Se não iniciado o esquema de vacinação aos 9 anos, a vacina HPV deve ser aplicada o mais precocemente possível. O esquema de vacinação para meninas e meninos é de três doses, sendo a segunda dose 1 a 2 meses depois da primeira e a terceira 6 meses depois da primeira.  | Contraindicada para gestantes.  | SIM, TANTO A BIVALENTE QUANTO A TETRAVALENTE                                       |
| <b>Tríplice Bacteriana<br/>(Difteria, Tétano e Coqueluche)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Com esquema de vacinação básico completo: dose de reforço 10 anos após a última dose.</li> <li>&gt; Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose a qualquer momento.</li> </ul>  | Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica, recomenda-se a vacina DTPa combinada à Poliomielite inativada. Gestantes: recomendada uma dose de DTPa entre a 27ª e a 36ª semana de gestação.  | SIM, TANTO A VACINA DTPA QUANTO A VACINA DTPA + POLIOMIELITE.                      |
| <b>Varicela (Catapora)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Para suscetíveis: duas doses.</li> <li>&gt; Para menores de 13 anos: intervalo de três meses entre as doses.</li> <li>&gt; A partir de 13 anos: intervalo de um a dois meses entre as doses.</li> </ul>  | Contraindicada para gestantes.  | SIM  |

| Vacinas recomendadas      | Esquemas e recomendações  | Comentários<br>(devem ser consultados)  | Tem na Previnna? |
|---------------------------|---|---|------------------|
| <b>Influenza (Gripe)</b>  | Dose única anual.   | Desde que disponível, a vacina influenza tetravalente é preferível à vacina influenza trivalente, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina tetravalente, utilizar a vacina trivalente. | SIM              |
| <b>Meningocócica ACWY</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Para não vacinados na infância: duas doses com intervalo de cinco anos entre elas.</li> <li>&gt; Para vacinados na infância: reforço aos 11 anos ou cinco anos após o último reforço na infância.</li> </ul>  | -   | SIM              |
| <b>Meningocócica B</b>    | Dois doses com intervalo de um a dois meses.  | -   | SIM              |
| <b>Febre Amarela</b>      | Uma dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação de vacinação (principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia). Se persistir o risco, fazer uma segunda dose dez anos após a primeira. Pode ser recomendada também para atender a exigências sanitárias de determinadas viagens internacionais. Em ambos os casos, vacinar pelo menos dez dias antes da viagem. | Contraindicada para gestantes e adolescentes amamentando bebês menores de 6 meses de idade.   | SIM              |
| <b>Dengue</b>             | Três doses com intervalo de seis meses entre elas.  | Contraindicada para imunodeprimidos, gestantes e adolescentes amamentando. Licenciada para pessoas entre 9 e 45 anos.   | SIM              |