

Vacinas recomendadas	Esquemas e recomendações	Comentários (devem ser consultados)	Tem na Previnna?
RECOMENDADAS			
Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche)	Uma dose, entre a 27ª e a 36ª semana de gestação.	A vacina contra a Tríplice Bacteriana está recomendada em todas as gestações, pois além de proteger a gestante e evitar que ela transmita a <i>Bordetella pertussis</i> ao recém-nascido, permite a transferência de anticorpos ao feto, protegendo-o nos primeiros meses de vida até que possa ser imunizado. A melhor época para a aplicação da vacina contra a Tríplice Bacteriana é entre a 27ª e a 36ª semana, pois permite a transferência de maior quantidade de anticorpos maternos para o feto, mas pode ser aplicada a partir da 20ª semana. Mulheres não vacinadas na gestação devem ser vacinadas o mais precocemente possível. A vacina está recomendada mesmo para aquelas que tiveram coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente.	SIM
Hepatite B	Três doses, sendo a segunda 1 mês após a primeira e a terceira 5 meses após a segunda.	A vacina hepatite B é recomendada para todas as gestantes suscetíveis.	SIM
Influenza (Gripe)	Dose única anual.	A gestante é grupo de risco para as complicações da infecção pelo vírus influenza. A vacina está recomendada nos meses da sazonalidade do vírus, mesmo no primeiro trimestre de gestação. Desde que disponível, a vacina influenza tetravalente é preferível à vacina influenza trivalente, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina tetravalente, utilizar a vacina trivalente.	SIM

Vacinas recomendadas	Esquemas e recomendações	Comentários (devem ser consultados)	Tem na Previnna?
RECOMENDADAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS			
Hepatite A	Duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas.	É vacina inativada, portanto sem contraindicação.	SIM
Hepatites A e B	<p>> Para menores de 16 anos: duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas.</p> <p>> Para maiores de 16 anos: três doses, sendo a segunda 1 mês após a primeira e a terceira 5 meses após a segunda.</p>	A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B.	SIM
Pneumocócicas (VPC13 e VPP23)	Esquema sequencial de VPC13 e VPP23 pode ser feito em gestantes de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI). Iniciar com uma dose da VPC13 seguida de uma dose de VPP23 de 6 a 12 meses depois.	VPC13 e VPP23 são vacinas inativadas, portanto sem riscos teóricos para a gestante e o feto.	SIM, A VACINA PREVENAR (PNEUMOCÓCICA 13/VPC13)
Meningocócica ACWY	Uma dose, caso seja indicado pelo obstetra.	As vacinas meningocócicas conjugadas são inativadas, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto, devendo ser consideradas em situações de risco epidemiológico.	SIM
Meningocócica B	Duas doses com intervalo de um a dois meses.	A vacina meningocócica B é inativada, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto, devendo ser considerada em situações de risco epidemiológico.	SIM

Vacinas recomendadas	Esquemas e recomendações	Comentários (devem ser consultados)	Tem na Previnna?
CONTRAINDICADAS			
Febre Amarela	Contraindicada na gestação. Porém, o médico deve avaliar a utilização quando os riscos de adquirir a doença superam os riscos potenciais da vacinação.	É contraindicada para mulheres que estão amamentando até que o bebê complete 6 meses. Se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por pelo menos 15 dias e preferencialmente por 30 dias após a imunização.	SIM
Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola)	Não vacinar na gestação.	Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação.	SIM
HPV	Não vacinar na gestação. Se a mulher tiver iniciado esquema antes da gestação, suspendê-lo até puerpério.	Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação.	SIM
Varicela (Catapora)	Não vacinar na gestação.	Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação.	SIM
Dengue	Não vacinar na gestação.	Contraindicada para mulheres amamentando.	SIM